

Human Thrombin

Thrombine humaine

Vial of 1000 NIH/flacon de 1000 NIH

Ref. EZ006B

STORE AT
2-8°C

FOR RESEARCH USE ONLY.
NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC
PROCEDURES

POUR LA RECHERCHE UNIQUEMENT.
NE PAS UTILISER DANS LES
PROCÉDURES DE DIAGNOSTIC

CONSERVER A
2-8°C

English, last revision 03-2025

Français, dernière révision 03-2025

ORIGIN:

Prepared from a prothrombin complex concentrate extracted from human citrated plasma and fully activated in a purified system. Thrombin is then purified using an ion exchange chromatography and stabilised. It is a highly purified preparation, mainly in the **α form, with a specific activity of more than ≥ 1500 NIH/mg.**

PRESENTATION:

Thrombin activity is reported in harmonized NIH or IU or USP units by reference to the WHO/NIBSC International Standard for Human Thrombin (19/188) (refer to "A reunification of the US ("NIH") and International Unit into a single standard for Thrombin", Longstaff et al, Thromb Haemost 2005, 93:261-6)). NIH is a clotting unit for thrombin activity. Stabilised and lyophilised human Thrombin.

Vial containing approximately 1000 NIH of thrombin.

This kit is for research use only and should not be used for patient diagnosis or treatment.

RECONSTITUTION:

Each vial must be restored with 2 mL distilled water, in order to get a concentration of about 500 NIH/mL. Dilute in the adequate buffer, if necessary.

EXCIPIENTS:

Content per vial: Poly-Ethylene-Glycol 6000 (PEG 6000) (40mg), Sodium Chloride (12mg), Glycine (40mg), BSA (20mg), stabilizers.

PURITY:

Human Thrombin has one major band of 35 000 daltons on SDS-PAGE.

ACTIVITY:

Clotting time (at 4NIH/mL) on purified human Fibrinogen (4 mg/mL): 8 ± 3.5 ".

Clotting time (at 10NIH/mL) on citrated human plasma pool: 5 ± 1 ".

Chromogenic activity on CS-01(38) substrate: $\geq 0.75/\text{min.NIH.mL}$.

Clotting activity determined in NIH (or IU).

Chromogenic activity on specific IIa substrates (expressed in **nkats/ μ g**) tested in the optimized conditions (0.05M Tris buffer at pH8.40, containing 0.30M NaCl), the exact activity in nkats/ μ g with CS-01(38) is reported on the analysis certificate for each lot.

VIRAL SAFETY:

The human plasma used for Thrombin purification was tested with registered methods and found negative for HIV antibodies, HBs Ag and HVC antibodies. Bovine Serum Albumin (BSA) was prepared from bovine plasma, which was tested for the absence of infectious agents, and collected from animals free from BSE. However, no assay may warrant the total absence of infectious agents. Any product of biological origin must then be handled with all the required cautions, as being potentially infectious.

USE:

For *in vitro* use only. All research studies and protocols where a source of highly purified human Thrombin is necessary.

The results obtained should be for research purposes only and not used for patient diagnosis or treatment.

STABILITY:

Restored : - 7 days at room temperature (18-25°C).
- 21 days at 2-8°C.
- 6 months at -30°C or below.
Lyophilized : Until the expiration date printed on the vial.

The stability of the reconstituted reagent should be checked under laboratory work conditions.

ORIGINE :

Préparée à partir d'un complexe prothrombine extrait de plasma humain citraté et totalement activé. La thrombine est ensuite purifiée par chromatographie d'échange d'ions puis stabilisée. Préparation hautement purifiée, majoritairement sous **forme α , présentant une activité spécifique ≥ 1500 NIH/mg.**

PRESENTATION :

L'activité de la thrombine est exprimée en unités harmonisées NIH ou UI ou USP, par rapport au standard international du WHO/NIBSC pour la thrombine humaine (19/188) (refer : "A reunification of the US ("NIH") and International Unit into a single standard for Thrombin", Longstaff et al, Thromb Haemost 2005, 93:261-6)). Le NIH est une unité définie en méthode coagulante, pour l'activité de la thrombine.

Thrombine humaine stabilisée et lyophilisée.

Flacon contenant environ 1000 NIH de thrombine.

Ce coffret est à usage de recherche uniquement et ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement du patient.

RECONSTITUTION :

Chaque flacon doit être reconstitué par 2 mL d'eau distillée, pour obtenir une concentration d'environ 500 NIH/mL. Diluer dans le tampon adéquat si nécessaire.

EXCIPIENTS :

Contenu par flacon : Poly-Ethylène-Glycol 6000 (PEG 6000) (40mg), Chlorure de sodium (12mg), Glycine (40mg), BSA (20mg), Stabilisants.

PURETE :

Une bande principale de 35 000 daltons sur SDS-PAGE.

ACTIVITE :

Temps de coagulation (à 4 NIH/mL) sur fibrinogène humain purifié (4 mg/mL) : 8 ± 3.5 ".

Temps de coagulation (à 10 NIH/mL) sur pool de plasma humain citraté : 5 ± 1 ".

Activité chromogénique sur substrat CS-01(38) : $\geq 0.75/\text{min.NIH.mL}$.

Activité coagulante déterminée en NIH (ou UI).

Activité chromogène sur substrats spécifiques IIa (exprimée en **nkats/ μ g**) testée dans des conditions optimisées (tampon Tris 0,05M à pH 8,40, contenant 0,30M de NaCl). L'activité exacte en nkats/ μ g avec le CS-01(38) est reportée pour chaque lot sur le certificat d'analyses.

SECURITE VIRALE :

Le plasma humain utilisé pour la purification de la thrombine humaine a été testé par des méthodes enregistrées et est certifié exempt d'anticorps VIH, de Hbs Ag et d'anticorps VHC. Le plasma bovin utilisé pour la préparation de la BSA a été testé par des méthodes enregistrées et est certifié exempt de maladies infectieuses, notamment de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Toutefois, aucune méthode ne permettant d'exclure totalement le risque d'agent pathogène, ces produits doivent être manipulés avec toutes les précautions requises pour l'utilisation de produits potentiellement infectés.

UTILISATION :

Utilisation *in vitro* exclusivement. Toutes les études ou protocoles dans lesquels l'utilisation d'une source de thrombine humaine hautement purifiée est nécessaire.

Les résultats obtenus doivent être utilisés à des fins de recherche uniquement et ne sont pas utilisables pour le diagnostic ou le traitement du patient.

STABILITE :

Reconstitué : - 7 jours à température ambiante (18-25°C).
- 21 jours à 2-8°C.
- 6 mois à -30°C ou moins.
Lyophilisé : Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon.

La stabilité du réactif reconstitué doit être vérifiée dans les conditions de travail du laboratoire.

Human Thrombin

Thrombine humaine

Vial of 1000 NIH/flacon de 1000 NIH

Ref. EZ006B

STORE AT
2-8°C

CONSERVER A
2-8°C

Lot :

Expiration :

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA/RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
1. Protein Content / Teneur protéique (Lowry method / Méthode Lowry) µg	≥ 300 µg
2. SDS-PAGE (4-12 % acrylamide) Human thrombin has 1 major band of about: La Thrombine humaine a une bande principale d'environ : 35 000 daltons	1 major band of about 1 bande principale d'≈ 35, 000 daltons
3. Clotting time / temps de coagulation (tested on Fibrinogen/ testé sur Fibrinogène) 	8 ± 3.5 sec.
4. Concentration of thrombin / concentration de la thrombine NIH (chromogenic)	1000 +/- 100 NIH (or IU)
5. Chromogenic activity / Activité chromogénique (on IIa substrate / sur substrat IIa CS-01(38) using IIa at 4NIH) ▪ A405 : ▪ Activity : /min.NIH.mL	A405 ≥ 0.75 /min.NIH.mL
6. Specific activity / Activité spécifique ▪ NIH (or IU) /mg (clotting) ▪ nkats/µg (chromogenic on CS-01(38)) ▪ nkats/NIH (or nkats/IU)	≥ 1 500 NIH (or IU)/mg ≥ 2 nkats/µg ≥ 1 nkat/NIH

*1 NIH is equivalent to 1 International Unit (IU) ("A reunification of the US ("NIH") and International Unit into a single standard for Thrombin", Longstaff et al, Thromb Haemost 2005, 93:261-6).

CONCLUSIONS

DATE :

☐ Passed/Conforme

☐ Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

NAME